外科収功

乾

外科收効序

余嘗謂縫合金刃傷及將帛紮束之法世俗以為昉于和蘭此殊不然也後漢書華陀傳云病結積在内鍼藥所不及者便飲其麻沸散須臾便如醉死因破取病若在腸中便斷腸湔

洗縫腹膏摩四五日瘥不痛通鑑唐紀載則天長壽二年大常工人安金蔵為明皇嗣不反引佩刀自剖其胸五臓皆出使醫内五蔵以桑皮線縫傳以藥是可以證漢唐而上已有其法也陳實功外科正宗及福惠全書

願體集王漁洋偶談紀老神仙事皆載縫合金創以帛紮定是可以証明清而下亦有其法也唯至于縫合之法繃縛之術則闕畧亡傳故其他瘍科書率用止血散血藥而已可謂鹵莽亦甚矣外科收効二卷擧繃縛法

數十條丁寧反覆如老婆誨兒女諄
〻然不能自己令人能領會其意而
後止謂之不隔靴而搔痒可也世醫
置一通手傍以背誦其文則臨手頭
傾腕断失血如瀑之際精神狂壯運
用如意必有能收其効者矣此收効

之所以為名而上木行世不亦可乎著斯編者誰大槻玄幹也捐貲而刻者誰玉生玄顧也不揣蕪陋而書其卷端者誰杉本良仲温也

文化甲戌冬日

樗園拙者

大槻玄幹磐水之子也嘗著揄縛圖式以問世余一見驚曰余称西洋眼科傳列醫官平生構思而所拖之縛法与是相符所謂暗合者耶事亦何太奇近又以國字詳審其縛法名曰外科収功蓋以便于初学之瘍醫也余謂此書与図式併観則於金刄傷之治療無復餘蘊矣因捐貲以上木云

甲戌南至

江都　侍醫土生壽玄碩題

外科収功序言

一瘍醫新書原本西哲某氏所撰而外科集成之書也全編一百十一篇以繃縛法為末篇蓋瘍醫之術千緒萬端皆以縛帶作収功此書即其約編也

一原本有繃縛總論篇既選其要語作凡例以為圖式之附言學者宜先熟讀附言而後就此篇玩味縛法再照圖式以修練其法術也

一綿布長短約以此方曲尺

一編中往往有骨傷脱臼整理之言近頃又就本書起外科要術之草宜俟上木之日而併考焉

平楨　識

外科収功巻之上目次

頭及頸部繃縛法篇第一

胸腹及陰處諸部繃縛法篇第二

外科収功巻之下目次

手臂諸部繃縛法篇第三

股脛及足跗繃縛法篇第四

右通計二十一帶

外科収功目次終

外科収功巻之上

本書瘍醫新書ハ向キニ磐水先生繼テ鸛齋先生之創艸ヲ以テ述ヘ之ヲ延ロ楨ニ抜テ斯ノ篇ヲ以テ講究シ其術ヲ而新ニ製シ圖式ヲ又且ツ與ニ岩恵山ト相ヒ謀リ訂正シ本篇ヲ撰シ此約篇ヲ以テ供ス急務ニ云フ爾文化甲戌秋八月平楨玄幹甫誌

頭及頸部繃縛法篇第一

両截四頭頭顱帶（綿布ノ製裁及ヒ寸尺主用等圖式ニ見ヘタリ下皆同シ）

醫師先ツ綿布ノ正中ヲ取テ患者ノ頭頂ニ施ス所ノ

○屋宇耳後ノ詞ナシ
コレヨリ去リテ
可ナリ然ラザ
レハ図式ト
合セズ

按定巾上ニ安シ其後部分裂ノ二端ヲ耳後ヨリ頷下ニ廻ラシ又頷ヨリ頭後ニ廻ラシテ左右共ニ結ビ止ムベシ又其前部ノ両端ハ前頂ニ附テ後頂ヘ引廻ラシ項ニ至テ共ニ此ヲ打チガヘ又耳上ヲ經テ頷ニ至リ結ビ止ルナリ

同前短帯

縛法前帯ト異ナルコトナシ但其後ロノ両端ヲ頷下ニテ結ビ前ノ両端ヲ項ニテ結ビ止ルナリ

湊合帯

醫師先ツ創口ニ抜爾撒摩様ノ主方ヲ塗テ且ツ粘連膏ヲ貼シ其両側ニ狭キ按定巾等ヲ施メ後ニ此

帯ノ孔アル所ヲ其創ノ右偏ニ當テ、左頭ハ姑ク創邊ニ停メ、右頭ヲ以テ頭後ヲ一廻メ、其孔ノ處マデ巻キ廻ラシ其巻軸ノ侭ヲ以テ其孔ノ有ル所ヲ、其創ノ右邊ニ當テ、左頭ハ姑ク創邊ニ停メ、右頭ヲ以テ頭後ヲ一廻メ、其孔ノ處マデ巻キ廻ラシ其巻軸ノ侭ヲ以テ其孔ニ穿チ通シ、其両軸ヲ以テ意ヲ用ヒテ左右ニ引ク、是ニテ其創脣ノ中央ヨリ相共ニ合シ両側ヨリ自ラ湊合シ程ヨクシマリ合スル様ニナスベキナリ、而後其両軸ヲ以テ両方ヨリ頭ヲ巻廻スニ右ト左ト其軸端ヲ亞ニ取チガヘ再ビ額ニ至リ、又初ノ如ク左右ヲ取チガヘ巻ナリ、此ヲ以

テ其創ヨク併合スルコヲ得ナリ、是ノ如クニメ、其帯ノ長サダケハ旋廻スベシ巻終リノ両端ヲバ、前ノ方ヘ廻シ綴釘ヲ以テ住ムルカ、又ハ針ニ系ヲ穿チ縫ヒ住ルモ可ナリ、又或ハ其創竪ニ狹長ナル中ニモ稍長キモノハ、右ノ法ノ如クニメ、一遍巻保セテ後、又再遍スルノ時、正ニ其創上アタル處、ニ新ニ一孔ヲ開キ、又初ノ如ク其巻軸ヲ以テ新孔ヲ穿チ通シ前ノ如ク左右相引ベシ、再ビ此法ヲナスニ因テ、其長キニ過タル創トイヘ𪜈夫ニ應シヨク引シヘリ合併メ、其愈ヘクチ必ス平等ニナルモノナリ、

分界帯一法　偏舟帯

醫師先ツ本帯ノ下端ヨリ上ニ尺三寸一分ノ處ヲ、額上創口按定巾等ヲ施シタル上ニアテ、左手ノ拇指ヲ以テオサヘ其端ハ姑ク垂レ下シヲキ、其巻軸ノ方ヲ以テ、斫十カラ頭圍ヲ一廻メ初メアテタル處ニ至ラシメ、而メ其垂下シタル端ヲ以テ額ヲ越ヘ矢縫ノ中行ニ循テ項ニ至リ、次テ軸頭ヲ其上ニ再廻セシメハ其下端ハ復始ノ如クニ還シ遂ニ其巻軸ノ方ヲ取テ其頭ノ圍ヲ周ツテ、初メ巻タル上ヲ數遍輪環様ニ旋廻シ其縛帯ノ畫ルニ至ルベシ其第二法扁舟帯ト名クルモノハ都テ第一法ノ如ナレ圧、其斜行ヲナスヲ異ナリトスコレ其頭頂ニ於

テ一濶處ヲナシ前後ノ所ヲ尖峭ナラシムルヨウニ巻イテナリ此其初メニ垂ル、帯ノ端ヲ初法ノ如ク正ク頭頂ノ中行ヲ越シメズ、其両偏ニ随テ斜行シ頭頂ニ於テ一濶所ヲ露ハス様ニ巻キ、其中間ハ廣ク前後ハ狭クメ、其狀自ラ扁舟ノ形ヲナサシムルナリ、是レ此名ヲ得ル所ナリ、原文ニモ此語筆記シ易カラズトアリ

紐釦帯

醫師先ツ其創口ニ按定小巾三箇ヲ按シ、而後本帯ヲ取リ、其中央ヲ創ナキ部ノ顳顬上ニアテ、両軸共ニ創アル方ノ顳顬上ニ至ラシメ、左右迭ニトリ違ヘ捩テ旋廻スベシカクノ如クスルヿ數遍、其布帯

ノ盡ルニ至ルベシ其動脈ノ創口ハ此力ヲ得テヨク壓定スルナリ

顱廻裹頭帶

醫師先ツ本帶ノ中央ヲ頭後ニ當テ頭圍ヲ旋廻スルヿ一回或ハ二回シ後頭ノ所ニテ兩頭相交ヘ左軸ハ矢縫ヲ過テ額上ニ下ラシメ右軸ハ又旋廻シ左軸ハ頭上ヲ覆フヿ漸々次第ニ左右トリチカヒ相開キ斜行回轉スルヿ數遍其帶巻キ盡メ頭ノ總部ヲ全ク包蓋シ緊固束縛スルニ至ルベシ

單縛眼帶

醫師先ツ應用ノ主方ヲ用ヒ按定巾ヲ置キ扨本帶

ヲ以テ頭後ニ當テ其一頭ヲ譬ヘバ右眼ナレハ右ニ斜行メ額ヲ過来リ眼上ニ至ランメ耳下ヲ經テ（原文无）復タ再ビ後頭ニ還シ如是スルヿ三遍ニ至ルベシ而後頭圍ヲ輪環様ニ廻スナリ若シ其帯ノ餘リアルモノハ數廻メ其盡ルニ至ルベシ其盡ル處ニテ綴針ヲ以テ穿チ留ムベシ

雙縛眼帯

縛法ニアリ其一頭トナスノ法ハ先ツ其帯ヲ後頭ニ置キ軸ヲナスノ方ヲ耳上ヲ歴テ斜行メ一方ノ眼ヲ蓋フヨウニ額ヲ過キ復タ後頭ニ還シ換テ始ノ如ク其一方ノ眼ニ向ヒ額上ヘ引キ額ヨリ斜下メ

其眼ヲ蓋ヒソレヨリ又引下シ復タ挨テ初ノ如ク
後頭ニ還ルナリ此ノ如ク廻スレ鼻額ノ邊左
右ユキチガヒ自ラ十字様ヲナシ能ク両眼共ニ蓋
ヒ塞ガルナリ乃チ其両眼上ヲ蓋フコト一左一右各
三襲ス其帯ノ餘レル所ヲ以テ右巻タル處ヲ固持
スルヨウニ顳顬筋ノ部及ビ額ノ上邊ヲ輪環様ニ
旋廻シ了ルベシ○又其両頭軸トナシ用ルノ法ハ即
チ両頭ノ中央ヲ前ノ如ク後頭ノ部ニ當テ両頭ヲ
以テ目ヲ蓋フヨウニ旋廻スベシ一頭ハ右眼ヲ覆
ヒ一頭ハ左眼ヲ覆フヨウニ相共ニ額ヲ過テ十字
様ヲナスナリ尤モ其帯ノ両頭ヲ取チガヘ右ノ者

ハ頭ノ左側ヲ越ヘ左ノ者ハ右側ヲ越ヘ共ニ後頭ニ至ル此ノ如クスル丁三次眼ヲ蓋フ丁名三襲ニ至ル尚其餘レル者ハ頭圍ヲ旋廻スル丁前式ノ如シ是施ス所ヲメヨク固定ナラシムルナリ

護鼻四頭帶

醫師先ツ本帶ノ中央ヘ孔ヲ開タル處ヲハ正ク鼻頭ニ當テ其上端ハ下ニ向ケ下端ハ上ニ向ケ耳上耳下ヲ廻ラシ左右兩端ヲ以テ少ク下ノ方ヘ向ケ項ニ至ラシメ左右相合シ十字様ヲナシ再ビ前ノ方額ノ上ヘ引廻ラメ其宜キ處ニテ結ビ留ルカ或ハ其着スル所ノ睡帽ニ綴釘ヲ以テ切ニサシ住ムベシ

其下ノ両端ハ、少ク上ノ方ヘ向ケ、後頭ヘ廻ラシ、是亦左右相合シ、十字様ヲナシ、再ヒ額ノ方ヘ廻ラシ、右ノ如ク結ビ留ルカ、或ハ綴針ヲ以テ住ムベシ、又此帯其長サ前法ノ半尺ヲ用ユル者アリ、此タド其両端ヲ後ロニテ結ブカ、或ハ綴釘ヲ以テ住ムベシ、凡ソ四頭帯ヲ用ヒテ、諸部ヲ保持セシムルノ定式ハ毎ニ其上ノ両端ヲ初メニ取テ、固ク巻キ留メ、而後下ノ両端ヲ上ヘ向ケ、十字様ニナルヨウニ上ニ升リ過スベキナリ、是ヨク其部ヲ収緊スルヲ以ナリ、

單箝口帯

醫師先ヅ折傷上ニ膏劑ヲ貼シ又焼酒ニ浸シタル巾及ビ髈骨ノ形ニ作レル副夾ハ搨巾等ヲ按シ而後此縛帯ヲ施スベシ其用法先ヅ其端ヲ頭後ニ當テ頭ノ圍ミヲ二廻スベシ是其主トスル所ヲ以メ緊束セシメンガ為メニ此ニ基ヲ為モノナリ而後折傷スル方ノ顳顬ノ所ニ廻ラシ来リ其上ニテ其帯ヲ綴釘ヲ以テヨク縫住ムベシソレヨリメ頷下ヘ引サゲ恙ナキ方ノ顳顬ヘ送リ升セ前頭ニ至リ再ビ折傷アル方ヘ送リ下スナリ此ノ如クスル丁凡ソ二遍或ハ三遍スベシ而後其帯ヲ後頭ノ方其給ヲナス所ノ上ノ交ヘ至ラシメ復タ前ノ方ニ至リ

六号ノ十二ノ図アリ

頷上ヲ過テ再ビ後頭ヘ巻キ戻シ留ムル十リ若シ其帯尚餘リアル寸ハ額ノ方ヘ廻シ其十字様ヲ十ス丿邊ニテ巻キ終リ是ヲ留ムベシ蓋是縛法ヲ以テヨク是ヲ固持スルヿハ顳顬ノ部ニテ両側共ニ左右前後ヨリ巻テ十字様ヲ為スヲ以テ十リ且ツ其帯ノ本基ノ所ハ綴針ヲ以テサシ留メ或ハ固ク縫住スルガ故ナリ又落下頦ノ症ニモ能ク此縛法ヲ用ヒテ便用ナリトス

複箝口帯

醫師折傷上及ビ頷下ニ安住スル藥酒紙巾等前條ノ如クシ而後本帯ヲ取リ其中央ヲ頷下ニ當テ左

右共ニ上ノ方顳顬ニ向テ巻キ升セ頭上ニ至ッテ両頭取リチガヘ再ビ頷下ニ下シ又頷ヨリ項ヘ廻スヿ是亦前ノ如シ此ノ如クスルヲ以テ其折傷ノ處ニ按スル副夾ヨク収緊ヲナスナリサテ其項ヘ巻キ廻ラシタル両端ヲ頷ノ方ヘ輪環様ニ頭圍ヲ旋廻スベシ其過數ハ餘帯ノ長短ニテカセ何ノ部ニテモ宜キ處ニテ巻キ畱ムベシ

代用箝口帯

縛法護鼻四頭帯ノ如シ其上ノ二頭ハ左右ヨリ項ヘ廻ラシ又頷ヘ廻シ両端ヲ結ビ畱ルナリ其下ノ両端ハ頭上ニ升セ宜キ處ニテ結ビ止ム其長サノ

多少ニ隨テ頷下ニテモ結フベシ此帯ノ便要ナルハ前條ノ二法ト其功用ヲ同ス、

假面布

是レ顔面ニ搨方塗藥ヲ施シタル後ニ用ルナリ又假面ニ藥酒ヲ浸シ或ハ膏油ヲ塗タル者ヲ蓋フヿアリ縛法宜ク圖ノ如クナスベシ

両分帯

用法先ツ本帯ノ中央ヲ額上ニ當テ頭ノ圍ミヲ二廻シ項後ニ下シ十字ニトリチガヘ後ロノ方ヨリ其両端ヲ左右腋下ニ垂下シ共ニ腋前ニ出シ取リチガヘ頭上ニ升ス尤モ移動スルヿナキヨウニハ 其

合ヿ處之帽子ニ縫ヒ付クベシ次ニ其ヲ取テ項後ニ下リ腋下ニ出シ前ノ如ク頭上ニ升スハ凡テ三回、緩急度ヲ得セシムベシ終ニ頭ノ圓ミヲ輪環様ニ旋廻シ了ルベシ此帯能ク頸ヲ正居セシムルガ故ニ火傷愈テ後斜屈スルノ虞ナキナリ

護頸帯

凡ソ頭頸ノ疾患アルニ當テハヨク其主方ヲ施シテ後ニ此帯ヲ施スベシ其コレヲ施スノ法先ツ其第二ノ短キ帯ヲ取テ其中央ヲ横ニ頭上ニワタラセ両端ヲ肩ニ垂レ下ラシメ置ベシ次ニ其長キモノヲ取テ其垂下シタル上ヲ[左ノ如ク之輪環様ニ頭頸

ヲ旋廻スヽコレヲ以テ其既ニ施ス所ノ主方及按定巾ヨク保定スルヿヲナスナリ｢即チ其第一ノ帯ハ両端ヲ以テ、其頭ヲ輪環様ニ旋廻スルナリ｣但シ是ヲ巻ヿ其宜キヲ得ヨウニナメ、必ス緊ク扎リ、頭ヲ緊急ハ呼吸ノ妨碍ナキヨウニメハ其旋廻シタル終ヲバ綴針ヲ以テ穿チ住ムベシ且ツ其始メ肩ニ垂下シタル両端ハ頭ノ方ニ升セ其宜キ所ニテ、又綴針ヲ以テ穿チ住ムベシ是｢ノ如ク縦横両輪ノ状ヲナス縛法ナルヲ以テヨク此ヲ保スルガ故ニ其施ス所ノ者｣容易ニ下垂スルヿナ｢キナリ｣

喉頭鑽孔法 主用咽喉諸症

醫師先ツ喉頭鑽孔法ヲ施シ氣管ノ裏面ニ當テ食道中ニ小管ヲ挿ミ其上ニ一孔ヲ穿チタル硬膏ヲ貫キ貼シ又右ノ如キ按定巾ヲ按シ其上ニ又孔ヲ穿タル縛帶ヲ以テ巻テ其管ヲ留ムベシ尤モ意ヲ用ヒテ患者ノ意ニ應スルヨウニナスベキナリ此方法ヲ用テ本病退ク者ハ其小管ヲ抜キ去リ創上ニ抜爾撒摩ヲ塗リ粘連膏ヲ貼シ随テ湊合帶ヲ施スハ他ノ竪長創傷ニ施スガ如クスベシ此帶大約幅ニ指横徑長サ四尺六寸二分ニ作ル者ヲ用ユルヲ得タリトス

胸腹及陰處諸部繃縛法篇第二

飜廻帯

醫師先ツ折骨ヲ整ヘテ後本帯ヲ施サントスルノ前鎖骨(ケツボン)ノ上下空罅ヲナスノ處ニハ狹長ニ作リタル按定巾ヲ按シ又其上按定巾ゴトニ狹片ノ夾紙(イタメガミ)ヲ以テ鎖骨(ケツボン)ノ長ミナリニ作リタル者ヲ按住スベシ此ノ如クスレバ其上下空罅ヲナス處ヲ填實シ其折骨ノ動揺游移ヲ防クナリ而後右ノ夾紙(イタメガミ)ノ上ニ其長ミニ傚ヒ正ク其折傷ノ處ニ於テ別ニ小片ノ夾紙ヲ按シ又其上ニ四角ナル按定巾ヲ置キ其上ニ大片ノ夾紙ヲ按シ右ノ如ク手當悉クナシ終テ(第十四ノ図)其處ヲヨク固定メ後ニハ本帯両頭軸ヲ取テ(其中央ヲ)肩上

「中央」ヨリ巻キ始メ、其前ナル一頭ハ下ノ方ニ向ヒ、胸ニ巻下ゲ、其後ナル一頭ハ斜メニ肩ヲ下リ、恙ナキ部ノ腋下ヲ潛リ、經其前頭「乙」ハ下リ「懸」(テ胸ニ行キ)ルモノヽ上ヲ過キ」患アル方ノ腋下ヲ經テ、再ビ脊ニ廻スナリ、サテ其前ニ下リ懸リタル前頭ハ其既ニ横ニ巻アゲタル帶ノ上ニ飜テ、肩ニ上リ、脊ニ下リ、其後頭ノ腋下ヨリ廻リ来ル者ヲ、其上ニ巻カケ、自ラ十字様ヲナスナリ、此ヨリメ又再ヒ前頭ハ脊ヨリ肩ヲ經、胸ニ下リ後頭ハ毎回其腋下胴部ヲ輪環様ニ旋廻スルナリ、前頭モ亦其毎回脊ニ下リ、此ノ如ク互ニ行合ヒ巻纏スルナリ、是ヲ以テ其始メ施ス處ノ按

定巾夾紙等ヨク按住スルヨウニ巻終ルベシ凡ソ此部ノ折傷ハ動モスレバ其折傷ノ處甚ダ離レ易キモノナルガ故ニ又別ニ一法ヲ用ヒザレバ保チ難キモノナリ故ニ右ノ縛法ヲ施シ後又一法ノ縛帶ヲ施シ用フベシ其帶長サ一丈八尺四寸八分幅三指横徑一頭軸ニ作ルベシ先ツ其帶ノ端ヲ恙ナキ部ノ腋下ニ當テ其軸ヲナス方ヲ後ヘ向ケ其體ヲ輪環樣ニ一廻シ恙ナキ部ノ腋下ニ至リ夫ヨリ斜メニ脊ヲ升テ前ニ向ヒ傷アル方ノ肩ヲ經腋下ヘ下リ後ロニ向ヒ上行シ脊ヲ經テ再ビ恙ナキ部ノ肩ヲ越ヘ腋下ニ下ルナリ夫ヨリ右ノ如ク前法

ヲ逐テ巻纏スル一數遍其両腋ヲ廻スノ形チ脊上ニ∞如キ此ノ狀ヲナスナリ此ニ由テ其腋後背ニ牽ツケ其整理シタル處再ビ動キ移ルノ預防トナリ能ク固持スルナリ又三四日ノ間ニハ其伸緩マル一アルモノナリ醫宜ク預メ別ニ一帶ヲ取テ其膊ノ中間ノ處ヲ軀幹ニ束縛シ固保セシムベシ又コノ治療中ハ其臂ヲ綿布ニテ釣リ保セヲク一手臂縛帶ノ部ニ說ルガ如クスルヲ要トス

單洨合喙帶 enkele koornuis verband

醫師骨傷ヲ整ヘテ後本帶ヲ取テ其巻端ヲ恙ナキ部ノ腋下ニテ人ヲシテ把住セシメ其軸ヲナス方ヲ

前ニ向ケ胸ヲ過テ斜上ニ折傷セル鎖骨上ニ至ラ
シメ又夫ヨリ肩胛ニ下リ、直チニ腋下ニ廻ラシ、前ヨ
リ再ビ上ニ飜シ背ヲ經テ、帶ノ始メヲナス腋下ニ
廻リ、上ニ飜シ背ヨリ斜メニ下リ、再ビ恙ナキ部ノ
腋下ニ至ルコト、又初ノ如クスルナリ、此ノ如ク巻纏
スルコト、凡ソ三回、尚意ヲ用ヒテ、其折傷ノ處、此縛帶
ニテヨク包盖シ強固ナラシムルヨウニナスベシ
三遍纏ヒテ後、折骨ノ傍ラ、腋ノ樞機ヲナス肩膊ノ
過ヲ一二遍輪環樣ニ旋廻シ而メ又其上臂ヲ左右
共ニ腋脇ニ着シメ、其上ヨリ又輪環樣ニ旋廻メ帶
ノ盈ル處ニテ留ムベシ

又一法、同帯ヲ取テ恙ナキ部ノ後ロヨリ腋下ニ當テ、軸ヲナス方ヲ、後ロニ向ケ、背ヲ越テ斜上シ、其患部ノ前ニ向ヒ、折骨ノ上ヲ過其腋下ニ下リ、後ロニ廻ラシ、復タ再ビ折骨上ニ飜リ、斜下メ胸ヲ經、恙ナキ部ノ腋下ニ至リ、又前ノ如ク旋廻スルコト、毎回前法ノ如シ、尤モ両臂ヲ束縛スルコトモ同様ニメ其帯ノ長サ盈ルニ至リ、其端ヲ為ス處ニテ固ク此ヲ留ムベシ、以上三法既ニコレタヾ其巻キ初メヲ前後ニ為ノミナリ、

此法實ニ簡便ノ良法ナリ

便法合喙帯

此法前條ノ骨傷ニ施メ、極メテ良便ニメ、且ツ一骨

両端折傷セル者ニハ殊ニ甚タ便要ナリトス是即チ鬣廻帯ニメ其帯ノ長サ二丈七尺七寸二分縛法左ノ如シ先ツ其帯ヲ取テ中央ノ處ヲ患アル方ノ腋下ニアテ其両頭ヲ以テ肩上ニ至ラシメ其處ニテ取チガヘテ十字様フナサシム而メ其一頭ハ前ニ下リ胸ニ至ラシメ又其一頭ハ背ヲ歴テ患ナキ方ノ腋下ニ下リ此處ニテ両頭トリチガヘ前ニ向フ端ハ胸ヲ經後ニ向フ者ハ背ヲ廻リ共ニ患アル方ノ腋下ニ至リ前後行キ合ヒ自ラ輪環様フナシ又コノ處ニテ両頭ヲ取カヘ再ヒ肩上ニ至ルハ初ノ如クシ上レハ則チ十字様フナシ前後両頭下テ患

ナキ方ノ腋下ニ至リ、前ノ如ク、體ヲ旋廻スルヿ再遍、初囘ノ如クシ、其患アル方ノ腋下ニイタル、其前ヨリ来ル一頭ハ、後ロノ方ニ、腋ヲ經廻リ上リテ前ニ向ヒ、折傷上ヲ過テ、胸上ニ垂下シ、後ロヨリ来ル一頭ハ、其帶ヲコヘテ、輪環樣ニ胸ヲ固ク旋廻シ、其始メ胸ニ下リ垂ル、者ハ、又再ビ飜シ肩ニ上行シ、背ニ下リ、其後ハ兩頭前法ノ如クスルナリ、右法ノ如クハ、前後上下シ、巻纏數遍スルヿハ、第一條ノ飜廻帶ニ記スルガ如クスベシ、蓋シ鎖骨(ケツボン)傷ハ、醫之レヲ整ヘテ後、毎ニ膊臂ノ重ミアルヲ以テ、其處ヲ離レ垂レ下ルヿヲ為スナリ、故ニ此縛法ヲ用フレバ、肩

上ニテ十字様ヲナシ其帯ノ前頭鎖骨傷ノ上ヲ經下テ、恙ナキ部ノ腋下ニ至ルヲ以テ、其折タル處ノ端、能ク臆中骨ノ方ニ附着シ、壓定スルナリ、或ハ其上方ニ放レ向フモノアレバ此法ヲ用ヒテ、必ズ下方ニ下リテ、本位ニ歸スルナリ、此法合喙鼱廻ノ二（初メノ二術ニテ）用ヲ兼テ、束縛二囬ニイタルヲ以テ、其折骨ツレニ應メ能ク按住スルナリ、其餘前後ノ扱ヒ方ハ尋常ノ鼱廻帯ト同様ニ心得ベシトナリ、此縛法古人意ヲ用テ、巧ミ出セル所ニメ、鎖骨傷ニ用ヒテハ尋常ノ法ヨリ、極メテ便要ナル良法ナリ、

又此骨脱臼スル者ハ醫之レヲ整ヘテ後、按定巾ニ

温メタル焼酎ヲ浸シ患上ニ按スベシ其臆中骨ノ傍ニテ脱臼セル者ハ鞦迴帯ヲ以テ折傷ニ施スガ如ク巻纏スベシ或ハ其骨陷没スル者ハ第一條ニ載スル所ノ第二法ノ縛帯ヲ兼子施スベシ此法ニ由テ其肩骨後ノ方ニ牽ツケル故ニ其陷没セル鎖骨上起シ出ルナリ又或ハ其脱臼上ニ突起スル者ハ其接合ヲナス處ノ上ニ厚キ按定巾ヲ置キ其鎖骨内ノ方ニ推壓メ能ク保ツヨウニナスベシ或ハ此脱臼肩胛ノ傍ラニアル者ハ単法合喙帯ノ法ヲ用フベシ或ハ左右両骨共ニ脱臼スル者ハ雙合喙帯ヲ用フベシ以下ニ出ス肩骨脱臼療法ノ處ニ記

スルガ如シ凡ソ此等ノ部位ニアル脱臼ハ毎ニ其膊臂モ亦一縛帶ヲ以テ釣上ルヿ手臂縛帶ニ説クガ如クスルヲ良トスルナリ

肩胛縛帶 箄合喙帶ノ副帶ナリ

肩骨ト肩胛トノ間脱臼スルモノハ醫之レヲ整ヘテ後箄法合喙帶ヲ用ユベシ且ツ其整フル所再ビ出臼セザルノ預防ヲナスガ為ニ一毬或ハ巻軸ニシタル綿布ヲ以テ腋下ニ墊起シ其ニ一按定巾[二]尺(一フート)三寸一[分]幅一手横徑ノモノヲ取テ両端ノ中程ヲ両裂ノ中間ヲ留メ四頭トナシ温酒或ハ焼酎[露](或ハ)水及ビ酢[醬水](ヲ合和スルモノヲ)ノ類ヲ撰[ミ]取テ(温メ)浸シ過シ絞リテ其中

央ヲ施ス處ノ毬下ニ當テ両端四頭ヲ機關上ニ巻キ住ムベシ此ニ由テ其施ス所ノ毬又巻軸布モ脱落スルヿナキナリ而メ後右ニ云フ単合喙帶ヲ以テ巻縛スベシ又此症恙ナキ部ノ腋下ニモ按定巾ヲ墊起スルヲ良トス此縛帶ニテ其處ニ痛ミヲ起サヾラシムルガ為ニスルナリ又此合喙帶ハ上臂骨ノ頸肩骨ニ接スル處ノ際ダ折傷スル者ニモ用ヒテ危モ功アリトス他ノ諸法ヲ施メ八更ニ功ヲ得ヿナキモノナリ

雙合喙帶

醫師本帶ヲ施スニ臨テ先ヅ左右腋下ニ一毬或ハ

按定巾ヲ墊起シ再脱ノ預防ヲナシ而メ後本帯ノ中央ヲ先ツ一方ノ腋下ニ當テ、其両頭ハ腋ヲ越テ上ニ升セ、肩上ニテ重子テ十字様ヲナシ、其後ニ向フ者ヲ前ノ方胸ニ下シ前ヨリ向フモノハ背後ニ廻ラシ、両頭共ニ一方ノ腋下ニ至リ行合ヒ互ニ取リ代テ後ロヨリ来ルモノ、ハ前ヨリ上ニ升リ、前ヨリ来ルモノハ後ロニ向ヒ前後肩上ニテ取リチカヘテ、再ビ始ノ腋下ニイタリ相會ノ又両頭トリチカヒ再ビ上ニ升テ、初ノ如ク十字様ヲナシ、前ノ如ク巻纒スルヿ、初法ノ如シ此ノ如クスルヿ左右各三廻ニ至ルベシ而メ後其帯ノ餘レルモノハ腋下

ノ處ニテ體ヲ一廻シ又肩機ノ處ヲ旋廻スルヿハ其餘帯ノ多少ニ任スベシ此ニ由テヨク其處縛定スルヿ即単合喙帯ヲナスガ如クスベシ

星象帯

醫師本帯ノ端ヲ後ロヨリ恙ナキ部ノ腋下ニ當テ其軸ヲナス方ヲ横ニ脊ヲ廻ラシ折傷アル方ノ腋下ニ至ラシメ此ヲ前ヨリ取テ肩ヲ越ヘ肩胛ニ至リテソノ既ニ施ス處ノ按定巾ヲ蓋ヒ背ヲ巻廻ラシテ又初ノ恙ナキ部ノ腋下ニ至リテ巻クヿ患部ノ如ク旋廻斜上メ背ヲ歴患部ノ腋下ニ至リ初回ノ如クス此ノ如ク両腋ヲ巻纒スルヿ数遍自ラ背

後ニテ∞ノ如キ形ナシ之ヲ以テ其折傷スル所ノ肩胛、全ク束縛スルニ至ルナリ蓋シ此縛法左右ノ肩胛ヲ全ク巻縛スルニ因テ、左右肩胛折傷スルモノニ用ユルモ亦甚タ便要ナリ又此折傷ニ兼用テ功アルモノハ第一條及第三條ニ說ク所ノ繃廻帯ヲ良トス

卓褓加肩衣帯

醫師先ツ第一條ノ綿布ヲ用テ、胸腹ノ患上ヲ旋廻シ其巻終リハ綴釘ヲ以テ刺シ止ムベシ而メ第二條ノ綿布ヲ取テ、其正中ノ孔ニ患者ノ頸ヲイレ肩ヨリ前後ニ埀レシメ、其両端ヲ腹背ノ横帯ニ著テ

綴針ニテ止ムベシ

四維張帯

醫師本帯ノ中央ヲ一方ノ腋下ニ當テ、両頭ヲ肩上ニ升セ十字様ヲナシ一頭ハ斜メニ胸ニ下リ一頭ハ背ヲ經テ一方ノ腋下ニ至リ前後相會シ又此處ニテ両頭ヲ上ニ升セ巻了一方ニテナセル如クニシ而メ又一方ノ腋下ニ至ラシメ両頭取リチガヘコヽニ至テハ肩上ニ升セズメ一頭ハ胸ニ一頭ハ背ト、其前後ヲ廻ラメ一方ノ脇ニ至ラシメ又一頭ハ前ヘ一頭ハ後ヘ両頭ヲ以テ左右彼此相互ニ旋廻ノ漸次ニ下ノ方ニ巻サゲ全ク胸ヲ蓋ヒテ殊ニ其患上

ニ能ク相應スルヨウニ意ヲ用テ巻縛スベシ

丁字樣帯

醫師法ノ如ク應用ノ諸方ヲ施メ後横帯ヲ以テ體ヲ廻ラシ縱帯ハ後部薦骨(カメノヲ)ヲ經テ両胯ノ間ヲ前ニ引出シ初メニ廻ラシ置タル横帯ニ結ヒ着クベシ此ノ如クナスガ為メニ其縱ニ下垂スルノ端ハ常テ両裂ニ作リ置ナリ又陰處諸部ニ於テ手術ヲ施シタル後ニ縛スルナハ面背地ヲ易テ縛スベシ醫尚此帯ノ下脱セザランコヲ欲セバ別ニ肩衣帯ヲ用テ附着セシムベシ

單胯縫帯

醫師先ツ脱臼折傷等ヲ整ヘ脱肛腸出ヲ推シ入レタル跡ニテ腋脇ノ傍ラ胯骨ノ直上ニ於テ其帯ヲ横ニ安シ腹ヲ過テ後ロニ至リ胯後ヲ經テ尻ニ至ラシメ胯間ヨリ前ノ方ヘ出シソレヨリ上ノ方ヘ廻スニ其瘡腫アル胯縫ニ己ニ按定巾ヲ施シタル上ヲ蓋フテ上ニ上リ後ヘ廻シ背ヘ向ヘ其始メタル處ヘ至リ其初ヲナス帯ノ端ヲ切ニ其處ニ固定スルヨウニ巻カクベシ此ノ如ク其帯ヲ數遍旋廻スルヿ初メ巻タルガ如クニシ其後ハ其端ヲ以テ腰腹ヲ旋廻シ終ルベシ

又法前條ノ丁字様帯ヲ前ヨリ始ムル者ノ如ク此

帯モ亦患處ノ方ニテ巻初メ一回メ、其處ニテ綴針ヲ用テサシ止メ、其軸ヲナセル方ヲ下ヘサゲ、後ノ方ヘ向フヨウニ胯間ヲ通シ巻クナリ、此ニ由テ其施ス處ノ按定巾ヨク蓋ヒ保ツナリ、ソレヨリメ後ノ方股骨ノ方ヘ巻キ廻ラシ前ヘ向ヘ再ビ按定巾上ヲ經過シソレヨリ又上ニ升リ、體軀ヲ旋廻シ、其巻終リノ處ニテ、固ク結ビ止ムベシ

雙胯縫帯

前症左右ニ發スル者ハ醫先ツ本帯ヲ以テ、患者ノ後ロニ立テ、其腰部ヲ輪環樣ニ一廻シソレヨリ兩頭左右取リ代ヘ尻ニ下リ、股ヲ通リ、兩胯縫ニ傍ヒ

其上ニ施ス處ノ按定巾ヲ蓋ヒ、再ビ両股ノ處ニ至ラシメ、而メ其體ヲ輪環様ニ一廻シ、又初ノ如ク後ロヨリ両胯ノ方ニ下リ上ツテ前ヨリ胯縫ヲ蓋ヒ、遂ニ初ノ如ク體圍ヲ廻ラシ巻キ止ムベシ

陰茎縛帯

疳瘡包茎及諸潰瘍ニ膏藥按定巾等ヲ施シタル後ハ醫本帯ヲ用テ、其両裂端ヲ一方ノ穴ニ通シ其中ニ陰茎ヲ容レテ束縛スル了、結束帯（ドウジメ）ノ如クスベシ

但シ此ヲ纒フニハ、漸々茎本ノ方ヘ巻キ下ゲ、其帯ノ終ル處ニテ両裂ノ端ヲ以テ固ク結ビ止ムベシ

外科収功巻之上終